

به هیچ وجه دستکش جایگزین Hand rub و شستن دست با آب و صابون نمی شود.

موارد استفاده از دستکش استریل

- انجام هر گونه اقدامات جراحی
- اقدامات رادیولوژیکی تهاجمی
- برقراری راه عروقی و انجام اقدامات مرتبط به راههای عروقی (ایجاد راه وریدی مرکزی در بیماران)
- آماده نمودن محلول های تغذیه مکمل جهت انفوزیون
- آماده نمودن داروهای شیمی درمانی جهت تزریق

Total Parietal Nutrition -



استفاده نامناسب از دستکش باعث انتقال پاتوژن‌ها میشود.

موارد استفاده از دستکش تمیز

تماس مستقیم با بیمار

- احتمال قرار گرفتن در معرض خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی بیمار و اشیاء و موارد دیگر
- بصورت مشهود آلوده به مایعات دفعی بیمار میباشد.
- تماس با غشاء مخاطی و پوست آسیب دیده بیمار
- احتمال قرار گرفتن در معرض تماس ارگانیسمهای شدیداً عفونی و خطرناک
- موقعیت های اورژانس یا ایبدمی
- گذاردن و یا کشیدن آنژیوکت و ...
- گرفتن خون از بیمار
- قطع یا بستن راه وریدی و کشیدن خون
- ساکشن سیستم های آندو تراشیال باز

تماس غیر مستقیم با بیمار

- تخلیه مواد برگشتی از معده بیمار
- جابجایی یا تمیز کردن وسایل و تجهیزات
- جابجایی یا تخلیه پسماند ها
- تمیز نمودن ترشحات مایعات بدن پاشیده شده روی اشیاء و یا در ضمن لکه گیری البسه

مواردیکه پوشیدن دستکش ضروری نمی باشد

تماس مستقیم با بیمار.

- گرفتن فشار خون، درجه حرارت و نبض بیمار
- تزریق زیر پوستی یا عضلانی به بیمار
- لباس پوشانیدن به بیمار
- انتقال بیمار
- مراقبت از گوش و یا چشم بیماران در صورت فقدان ترشحات
- هرگونه مراقبت از راه وریدی در بیماران در صورت عدم نشت خون

تماس غیر مستقیم با بیماران

- استفاده از گوشی تلفن مشترک بین بیماران و کادر بخش
- درج گزارش در پرونده بالینی و یا چارت بالای سر بیمار
- دادن داروی خوراکی به بیماران
- جمع نمودن سینی غذای بیمار و یا قطع لوله تغذیه ای بیمار
- تعویض ملحفه بیمار در صورتیکه بیمار ایزوله تماسی نباشد و یا ملحفه بیمار آلوده به ترشحات و مواد دفعی بیمار نباشد.
- گذاردن ماسک تنفسی و یا کاتولای بینی بصورت غیر تهاجمی برای بیمار
- جابجایی اثاثیه بیمار

رفتار: دستورالعمل رعایت بهداشت دست
واحد کنترل عفونت