



مرکز آموزشی و درمانی امیرالمؤمنین علی (ع)

مراغه

موضوع:

نحوه مراقبت از

کاتتر در بیماران همودیالیزی



تهیه و تنظیم:

واحد آموزش سلامت

بهار 1402


❖ باکتری می (وجود باکتری در خون) ناشی

از کاتتر عارضه شایعی است.

❖ علائم عفونت عمومی بدن در بیمار

وجود دارد. در نوع خفیف تب وجود دارد و علائم

عفونت بعد از شروع دیالیز شدید تر می شود.



نحوه مراقبت از کاتتر دائمی:

کاتترهای دائمی بعد از گذشت 20 روز نیاز به

انجام پانسمان روی محل خروج کاتتر ندارند.

نحوه مراقبت کاتترهای دائمی مانند کاتترهای

موقت می باشد.

عفونت کاتترهای دائمی :

عفونت موضعی پوست و بافت نرم اطراف محل

کاتتر با علائم زیر بروز می کند:

❖ لمس دردناک ، تورم و قرمزی در طول

مسیر کاتتر در زیر پوست و ترشح چرکی

از محل خروج کاتتر .



کاتتر :

کاتتر لوله ای پلاستیکی است که بصورت عروقی استفاده می شود. بدین معنا که درون عروق بزرگ قرار گرفته و در جای خود ثابت می شود. این لوله بیشتر در محل رگ های کشاله ران، رگ های گردن یا سینه استفاده می شود. بدلیل انعطاف زیاد این لوله، با کمی تغییر در شکل آن، می توان از آن برای عمل های بسیاری نظیر عمل های قلب و عروق، اورولوژی، سیستم عصبی و گوارشی استفاده کرد.



کاتتر و انواع آن :

یکی از روشهای دسترسی عروقی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تعبیه کاتتری باشد که به دوصورت موقت و دائمی وجود دارد :

الف) کاتتر موقت عروقی

تعبیه این نوع کاتتر ازطریق وارد کردن کاتتر از راه پوست به یکی از سیاهرگهای (وریدهای) بزرگ انجام می شود و کاتتر موقت تا زمانی که فیستول بیمار شروع به کار کند و قابل استفاده شود یعنی حداکثر تا 30

ب) کاتتر دائمی

به مدت شش ماه تا یکسال قابل استفاده می باشد. کاتترهای دائمی نسبت به کاتترهای موقت هم بلندتر هستند و هم جریان خون آنها بیشتر است.

❖ از وارد شدن ضربه به کاتتر و ایجاد کشش در آن

به خصوص در زمان همودیالیز خودداری کنید.

❖ در اوقاتی که دیالیز انجام نمی شود نیز

از هرگونه خم شدن لوله های (لایین های) کاتتر

ممانعت کنید.

❖ در پوش لوله های (لایین های) کاتتر را هیچ گاه

باز نکنید.

❖ از باز کردن کلمپ های کاتتر خودداری کنید.

❖ بعد از هر بار دیالیز محل کاتتر باید پانسمان شود

و از بازنگه داشتن محل خروجی کاتتر

اجتناب کنید.

❖ در صورتیکه کاتتر جابجا گردد آن را به جلولیاقب

حرکت ندهید.

❖ قسمت خارجی کاتتر هرگز نباید در آب حمام

غوطه ور شود و یا در آب فرو رود پس بهتر است

هر ناحیه از بدن را طوری شست و بشوید تا آب

کمتری به سمت کاتتر سرازیر شود و همچنین

زمان استحمام نیز باید کوتاه باشد.

❖ محل کاتتر را کاملاً تمیز و خشک نگه دارید.

❖ در صورت خونریزی از محل کاتتر فوراً به

پزشک معالج اطلاع دهید.

عفونت کاتترهای موقت :

عفونت محل خروج کاتتر و عفونت عمومی بدن با تب

و افزایش میزان گلبول های سفید خون بروز می کند.

درجه حرارت بدن حین دیالیز ممکن است افزایش

یابد.

علائم ظاهری عفونت ناشی از جسم خارجی مثل

قرمزی ، ترشح و گرما در محل خروج کاتتر ممکن

است وجود داشته باشد .

آنتی بیوتیک جهت درمان تحت نظر پزشک شروع

می شود . درمان آنتی بیوتیکی بین 2 تا 3 هفته طول

میکشد

